

Corrigendum: *Zoosystema* volume 41, article 12

Abdou A., Lord C., Keith P. & Galzin R. 2019. — Phylogéographie de *Neritina stumpffi* Boettger, 1890 et *Neritina canalis* Sowerby, 1825 (Gastropoda, Cycloneritida, Neritidae). *Zoosystema* 41 (12): 237-248. <https://doi.org/10.5252/zoosystema-2019v41a12>. <http://zoosystema.com/41/12>

Dans la Figure 4 illustrant le réseau d'haplotypes de *Neritina stumpffi* Boettger, 1890, le demi-cercle représentant les Seychelles a été oublié. La Figure 4 est reproduite ici. De même, dans la la Figure 5 représentant le réseau d'haplotypes de *Neritina canalis* Sowerby, 1825, le demi-cercle représentant Tahiti a été oublié. La Figure 5 est reproduite ici.

In Figure 4 illustrating the web of haplotypes of Neritina stumpffi Boettger, 1890, the semicircle representing Seychelles has been forgotten. Figure 4 is reproduced here. Similarly, in Figure 5 showing the haplotype network of Neritina canalis Sowerby, 1825, the semicircle representing Tahiti has been forgotten. Figure 5 is reproduced here.




FIG. 4. — Réseau d'haplotypes de *Neritina stumpffi* Boettger, 1890 selon la méthode du median-joining. Les cercles sont proportionnels à la fréquence des occurrences, le nombre de mutations est indiqué sur les branches par des tirets.




FIG. 5. — Réseau d'haplotypes de *Neritina canalis* Sowerby, 1825 selon la méthode du median-joining. Les cercles sont proportionnels à la fréquence des occurrences, le nombre de mutations est indiqué sur les branches par des tirets.